

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Prednisolona) (SUSPENSIÓN (AGITAR))**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **PREDNEFRIN SF (Prednisolona) (SUSPENSIÓN (AGITAR))**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 2 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **AVELUX 0.5ML (Moxifloxacino) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **ELIPTIC OFTENNO (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **T-P OFTENNO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE NO SUSPENDER
- **EYESTIL PLUS 10 ML (Hialuronato de sodio 4%) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA MAÑANA HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **EN TRES DÍAS**

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico _____
PATRICIA NAVARRO