

Rp:

- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **SOPHIPREN OFTENO (Prednisolona) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS DENTRO DEL OJO, CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 4 MESES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico _____
SELENE RODRIGUEZ CASTRO