

Rp:

- **SYSTANE COMPLETE (Propilenglicol) 10 ML (GOTAS)**
 APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**
 APLICAR EN OJO AMBOS OJOS DENTRO DEL OJO Y EN LOS PARPADOS, CADA 8 HORAS DURANTE 15 DIAS

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- FOMENTOS TIBIOS CON AGUA TIBIA DURANTE 10 MINUTOS, LUEGO COMPRIMIR BORDE PALPEBRAL Y AL FINAL REALIZAR ASEO CON AGUA TIBIA Y SHAMPOO DE BEBÉ DIARIO
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 MES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico _____
 YOLANDA CHAVEZ ROMERO