

Rp:

- **3-A OFTENO (Diclofenaco) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **VOLTAREN RETARD 100 MG (TABLETAS)**
TOMAR UNA TABLETA CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **METICORTEN (Prednisona) 20 MG (TABLETAS)**
TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

ILSE LOPEZ OSORIO