

Rp:

- **T&B (MOXIFLOXACINO) GOTAS 5 ML (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 1 HORA NO SUSPENDER
- **NETIRA (Netilmicina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 1 HORA NO SUSPENDER
- **T-P OFTENNO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: EN TRES DÍAS

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

ILSE LOPEZ OSORIO