

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 2 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **SOPHIXIN DX OFTENO (Ciprofloxacino/Dexametasona) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **COMBIGAN D (Brimonidina/Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **HUMYLUB OFTENO 10 ML (Sulfato Sódico de Condroitina, Hialuronato de Sodio) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: EN CINCO DÍAS

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

YOLANDA CHAVEZ ROMERO