

Rp:

- **IMOT OFTENO 0.5% (Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **T&B (MOXIFLOXACINO) GOTAS 5 ML (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS HASTA TERMINAR
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS NO SUSPENDER
- **HUMYLUB OFTENO 10 ML (Sulfato Sódico de Condroitina, Hialuronato de Sodio) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 2 HORAS NO SUSPENDER
- **T-P OFTENO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA NOCHE HASTA TERMINAR

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 SEMANA

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

JORGE RIVERA SEMPETEGUI