

**Rp:**

- **SOPHIXIN DX OFTENÓ (Ciprofloxacino/Dexametasona) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS HASTA TERMINAR
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **LUBREX (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que están siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 SEMANAS

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico \_\_\_\_\_  
**PATRICIA NAVARRO**