

Rp:

- **NETIRA (Netilmicina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS DURANTE 3 DIAS
- **EYESTIL LUB 10 ML (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **IMOT OFTENO 0.5% (Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **ASPIRINA PROTECT (ACIDO ACETILSALICÍLICO) 100 MG (TABLETAS)**
TOMAR UNA TABLETA CADA NOCHE NO SUSPENDER
- **ATORVASTATINA 20 MG (TABLETAS)**
TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

SELENE RODRIGUEZ CASTRO