

**Rp:**

- **T&B (MOXIFLOXACINO) GOTAS 5 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 4 HORAS DURANTE 10 DIAS
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **GAAP (Latanoprost) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA NOCHE HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **IMOT OFTENO 0.5% (Timolol) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta:      **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_



Médico

**CLARISA ESTHER DEL HIERRO  
GUTIERREZ**