

**Rp:**

- **ELIPTIC OFTENO (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **SOPHIXIN DX OFTENO (Ciprofloxacino/Dexametasona) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 3 HORAS NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **HUMYLUB (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: EN CINCO DÍAS

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**JORGE RIVERA SEMPETEGUI**