

**Rp:**

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **T&B (MOXIFLOXACINO) GOTAS 5 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **EYESTIL LUB 10 ML (Hialuronato de sodio 1.5%) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Mantener el frasco o gotero en un lugar frío.
- No dormir del lado operado hasta la próxima cita.
- No estar en contacto con la tierra, no polvo, no sol, no calor, no cocina hasta la próxima cita.
- No realizar esfuerzos ni cargar cosas pesadas hasta la próxima cita.
- No tallarse los ojos.
- Puede ver televisión, usar la computadora o el celular
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento
- Usar gorra y lentes oscuros como medidas de protección hasta la próxima cita.

Próxima consulta: 1 SEMANA

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

YOLANDA CHAVEZ ROMERO