

**Rp:**

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **EYESTIL LUB 10 ML (Hialuronato de sodio 1.5%) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **T&B (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS DURANTE 7 DIAS
- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS HASTA TERMINAR

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 SEMANAS  
Fecha de cita: \_\_\_\_\_  
Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_  
Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**CLARISA ESTHER DEL HIERRO  
GUTIERREZ**