

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA MAÑANA HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **T-P OFTENO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA NOCHE HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **Valaciclovir 500 mg (TABLETAS)**
TOMAR CUATRO TABLETA CADA 8 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **METICORTEN (Prednisona) 20 MG (TABLETAS)**
TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 SEMANA
Fecha de cita: _____
Próxima cita: Dr(a) _____
Agendó: _____

Médico

PATRICIA NAVARRO