

**Rp:**

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **AVELUX 0.5ML (Moxifloxacino) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **GAAP (Latanoprost) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE NO SUSPENDER
- **LUBREX (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: EN CINCO DÍAS

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

YOLANDA CHAVEZ ROMERO