

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 8 HORAS DURANTE 7 DIAS
- **T&B (MOXIFLOXACINO) GOTAS 5 ML (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 8 HORAS DURANTE 5 DIAS
- **IMOT OFTENO 0.5% (Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS DURANTE 15 DIAS
- **LUBREX (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 MES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

YOLANDA CHAVEZ ROMERO