

Rp:

- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) (SUSPENSIÓN (AGITAR))**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **ATRO OFTENNO 1 % (Atropina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **ATORVASTATINA 20 MG (TABLETAS)**
TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 MES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

SELENE RODRIGUEZ CASTRO