

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Prednisolona) (SUSPENSIÓN (AGITAR))**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **T-P OFTENO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **ELIPTIC OFTENO (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 24 HORAS NO SUSPENDER
- **EYESTIL LUB 10 ML (Hialuronato de sodio 1.5%) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 MES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

**DIANA MARCELA SARMIENTO
FORERO**