

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS HASTA TERMINAR
- **EYESTIL LUB 10 ML (Hialuronato de sodio 1.5%) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Realizar masajes cuatro veces al día como le explicó su doctor durante 20 a 30 segundos en pacientes operados de Implante Valvular para control de Glaucoma.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 3 SEMANAS

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

PATRICIA NAVARRO