

**Rp:**

- **AVELUX 0.5ML (Moxifloxacino) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS HASTA TERMINAR
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 3 HORAS NO SUSPENDER
- **T-P OFTENNO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS HASTA TERMINAR
- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS NO SUSPENDER
- **REFRESH RELIEVA PF (Carboximetilcelulosa/Glicerina/Hialuronato de Sodio) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **ACETADIAZOL 250 MG (Acetazolamida) (TABLETAS)**  
TOMAR 1/2 (MEDIA) TABLETA CADA 12 HORAS HASTA TERMINAR

**Recomendaciones:**


- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **EN 10 DÍAS**

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_



Médico

**JORGE RIVERA SEMPETEGUI**