

**Rp:**

- **REFRESH TEARS (Carboximetilcelulosa) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**  
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS DENTRO DEL OJO Y EN LOS PARPADOS, CADA 8 HORAS DURANTE 15 DIAS
- **MINOCIN (Minociclina) 100 MG (CÁPSULAS)**  
TOMAR UNA CÁPSULA CADA 12 HORAS DURANTE 21 DIAS

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Realizar aseo del borde las pestañas con ayuda de un aplicador o toallitas en la mañana y en la noche como le indico su doctor hasta la próxima cita.
- Realizar fomentos TIBIOS en el párpado afectado cada 6 horas, durante 10 minutos por 7 días.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 3 SEMANAS  
Fecha de cita: \_\_\_\_\_  
Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_  
Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**GABRIELA JUDITH MAGGIANI HARO**