

**Rp:**

- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **NANODROP (Propilenglicol) 10 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**  
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS EN LOS PÁRPADOS, CADA NOCHE HASTA TERMINAR

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que están siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta:      4 MESES

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_



Médico

**SELENE RODRIGUEZ CASTRO**