

**Rp:**

- **COMBIGAN D (Brimonidina/Timolol) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **GAAP (Latanoprost) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN AMBOS OJOS CADA 24 HORAS DURANTE 7 DIAS
- **LUBREX (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**YOLANDA CHAVEZ ROMERO**