

Rp:

- **ELIPTIC OFTENO (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA NOCHE DURANTE 15 DIAS
- **LUBREX 10 ML (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **KLIMI TOALLITAS OFTÁLMICAS (CAJA)**
APLICAR UNA TOALLA EN AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA 12 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

GOTTLINDA PAYAN GONZALEZ