

Rp:

- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**
APLICAR EN OJO IZQUIERDO DENTRO DEL OJO, CADA 8 HORAS HASTA TERMINAR
- **ZEBESTEN (Bromfenaco sódico 0.9MG) 5ML (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 2 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: EN 10 DÍAS
Fecha de cita: _____
Próxima cita: Dr(a) _____
Agendó: _____

Médico

**DIANA MARCELA SARMIENTO
FORERO**