

Rp:

- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **T-P OFTENNO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA NOCHE NO SUSPENDER
- **SOPHIXIN DX OFTENNO (Ciprofloxacino/Dexametasona) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 2 HORAS DURANTE 2 DIAS
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 3 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que están siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

SELENE RODRIGUEZ CASTRO