

Rp:

- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**
APLICAR EN OJO IZQUIERDO DENTRO DEL OJO, CADA NOCHE HASTA TERMINAR
- **NANODROP (Propilenglicol) 10 ML (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA EN CASO DE MOLESTIA NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: **CON RESULTADOS**

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

SELENE RODRIGUEZ CASTRO