

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 6 HORAS DURANTE 15 DIAS
- **AVELUX 0.5ML (Moxifloxacino) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 6 HORAS DURANTE 5 DIAS
- **IMOT OFTENO 0.5% (Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **HUMYLUB OFTENO 10 ML (Sulfato Sódico de Condroitina, Hialuronato de Sodio) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 SEMANA
Fecha de cita: _____
Próxima cita: Dr(a) _____
Agendó: _____

Médico

YOLANDA CHAVEZ ROMERO