

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **ETACORTILEN (Dexametasona) (GOTAS AMPOLLETAS UNIDOSIS)**
APLICAR UNA GOTTA AMPOLLETA UNIDOSIS EN OJO DERECHO CADA 6 HORAS HASTA TERMINAR
- **HIPERTON 10% (Cloruro de sodio) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 6 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **EYESTIL LUB 10 ML (Hialuronato de sodio 1.5%) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 3 SEMANAS
Fecha de cita: _____
Próxima cita: Dr(a) _____
Agendó: _____

Médico

YOLANDA CHAVEZ ROMERO