

Rp:

- **T-P OFTENO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA NOCHE HASTA TERMINAR
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS HASTA TERMINAR
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**
APLICAR EN OJO IZQUIERDO DENTRO DEL OJO, CADA NOCHE HASTA TERMINAR
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **IMOT OFTENO 0.5% (Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **LUBREX 10 ML (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS HASTA TERMINAR

Recomendaciones:


- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 SEMANAS

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

JORGE RIVERA SEMPETEGUI