

**Rp:**

- **T-P OFTENO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **VIRGANGEL (Ganciclovir) GEL 1.5 MG (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**  
APLICAR EN OJO IZQUIERDO DENTRO DEL OJO, CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO IZQUIERDO CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 SEMANAS  
Fecha de cita: \_\_\_\_\_  
Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_  
Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

SELENE RODRIGUEZ CASTRO