

**Rp:**

- **SOPHIXIN DX OFTEN (Ciprofloxacino/Dexametasona) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 2 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **NANODROP (Propilenglicol) 10 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Evitar la exposición al sol.
- No dormir del lado operado hasta la próxima cita.
- No estar en contacto con la tierra, no polvo, no sol, no calor, no cocina hasta la próxima cita.
- No realizar esfuerzos ni cargar cosas pesadas hasta la próxima cita.
- No tallarse los ojos.
- Prohibido colocar parche o cualquier otra sustancia sobre el ojo que no sea la indicada por su médico.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que están siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento
- Usar gorra y lentes oscuros como medidas de protección hasta la próxima cita.

Próxima consulta: 1 SEMANA

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_



Médico

**PATRICIA NAVARRO**