

Rp:

- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**
APLICAR EN OJO IZQUIERDO DENTRO DEL OJO Y EN LOS PÁRPADOS, CADA 8 HORAS DURANTE 14 DIAS
- **PATANOL (Olopatadina) 0.2% (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE DURANTE DOS MESES
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Realizar fomentos TIBIOS en el párpado afectado cada 6 horas, durante 10 minutos por 7 días.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 SEMANAS

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

GABRIELA JUDITH MAGGIANI HARO