

**Rp:**

- **SYSTANE ULTRA SP (Propilenglicol 0.3%) 10 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**  
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA 8 HORAS HASTA TERMINAR
- **KLIMI TOALLITAS OFTÁLMICAS (CAJA)**  
APLICAR UNA TOALLA EN AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA EN LA NOCHE NO SUSPENDER
- **RIBOTRIPSIN (Quimiotripsina) (TABLETAS)**  
TOMAR DOS TABLETA CADA 8 HORAS DURANTE 5 DIAS

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 MESES  
Fecha de cita: \_\_\_\_\_  
Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_  
Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**DIANA MARCELA SARMIENTO  
FORERO**