

Rp:

- **AVELUX 0.5ML (Moxifloxacino) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 4 HORAS DURANTE 3 DIAS
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 4 HORAS DURANTE 7 DIAS
- **COMBIGAN D (Brimonidina/Timolol) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **EYESTIL LUB 10 ML (Hialuronato de sodio 1.5%) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 SEMANAS
Fecha de cita: _____
Próxima cita: Dr(a) _____
Agendó: _____

Médico

ALEJANDRA SANCHEZ ALDANA