

Rp:

- **SOPHIXIN DX OFTENNO (Ciprofloxacino/Dexametasona) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 6 HORAS DURANTE 7 DIAS
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA 12 HORAS HASTA TERMINAR
- **KLIMI TOALLITAS OFTÁLMICAS (CAJA)**
APLICAR UNA TOALLA EN AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 3 SEMANAS
Fecha de cita: _____
Próxima cita: Dr(a) _____
Agendó: _____

Médico

GOTTLINDA PAYAN GONZALEZ