

**Rp:**

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN AMBOS OJOS CADA 24 HORAS NO SUSPENDER
- **T-P OFTENO (Tropicamida/Fenilefrina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE NO SUSPENDER
- **THEALOZ (Trehalosa) gotas 3% 10 ML (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS NO SUSPENDER
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**  
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS DENTRO DEL OJO, CADA NOCHE HASTA TERMINAR
- **GAAP (Latanoprost) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta:      2 MESES

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_



Médico

**DIANA MARCELA SARMIENTO  
FORERO**