

**Rp:**

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**  
APLICAR UNA GOTTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 8 HORAS DURANTE 5 DIAS
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**  
APLICAR EN OJO DERECHO DENTRO DEL OJO, CADA 12 HORAS DURANTE 15 DIAS
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **ELIPTIC OFTENOL (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 MES  
Fecha de cita: \_\_\_\_\_  
Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_  
Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

ALEJANDRA SANCHEZ ALDANA