

**Rp:**

- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **SOPHIPREN OFTENO (Prednisolona) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA EN CASO DE MOLESTIA HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **AQUADRAN GEL 50 MG (Dexpantenol) (GEL OCULAR 10 GR)**  
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS DENTRO DEL OJO, CADA NOCHE NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta:      6 MESES

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_



Médico

**ALEJANDRA SANCHEZ ALDANA**