

Rp:

- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN OJO DERECHO CADA 24 HORAS NO SUSPENDER
- **SOPHIXIN (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 8 HORAS DURANTE 5 DIAS
- **LOSARTAN gotas (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN OJO DERECHO CADA 6 HORAS DURANTE DOS MESES
- **HUMYLUB OFTENNO 10 ML (Sulfato Sódico de Condroitina, Hialuronato de Sodio) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 6 HORAS NO SUSPENDER
- **ELIPTIC OFTENNO (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 3 MESES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

**DIANA MARCELA SARMIENTO
FORERO**